

Флюорография

Подготовки не требует.

Маммография

Для женщин репродуктивного возраста на 7-10 день менструального цикла, для женщин в менопаузе в любое время.

Исследования костно-суставной системы

Производятся без подготовки, за исключением рентгенографии пояснично-крестцового отдела позвоночника, перед проведением которой необходимо ограничить пищу богатую клетчаткой, сделать 2 очистительные клизмы накануне вечером и утром перед исследованием (можно заменить приемом препарата «Фортранс» согласно прилагающейся к нему инструкции).

Исследования мочевыделительной системы

Перед проведением необходимо ограничить пищу богатую клетчаткой, сделать 2 очистительные клизмы накануне вечером и утром перед исследованием (можно заменить приемом препарата «Фортранс» согласно прилагающейся к нему инструкции), иметь данные биохимического анализа крови (мочевина, креатинин).

Исследования желудочно-кишечного тракта

а) исследования пищевода, желудка, тонкого кишечника проводятся натощак, с отказом от курения в день исследования;

б) при подготовке к исследованию толстого кишечника (ирригоскопии) необходимо ограничить пищу богатую клетчаткой, сделать 2 очистительные клизмы накануне вечером и утром перед исследованием (можно заменить приемом препарата «Фортранс» согласно прилагающейся к нему инструкции).

Компьютерная томография

а) Без введения контраста – подготовки не требует.

б) КТ с контрастным усилением проводятся натощак, необходимо иметь данные биохимического анализа крови (мочевина, креатинин), требуется установка кубитального катетера (в локтевую вену) диаметром G18.

в) КТ- исследованию органов малого таза:

при проведении исследования в первой половине дня до 14.00:

— накануне, вечером – проводится очистительная клизма с помощью кружки Эсмарха (1,5л.) в 18.00 и в 22.00;

— с 20.00 до 21.00 пациент дробно выпивает 0,5-0,75 литра контрастного раствора, для приготовления которого необходимо развести ½ ампулы 76% натрия амидотризоата в 0,5-0,75 литра воды;

— утром – очистительная клизма с помощью кружки Эсмарха;

— обильное питье (до 1,5 литров);

— исследование проводится с наполненным мочевым пузырем, после микроклизмы (состав: ½ ампулы 76% натрия амидотризоата + 200 мл воды)

— женщинам рекомендуется установка тампона во влагалище, пропитанного контрастным веществом.

при проведении исследования во второй половине дня после 14.00:

— утром — проводится очистительная клизма с помощью кружки Эсмарха (1,5 л.) в 08.00;

— с 07.00 до 08.00 пациент дробно выпивает 0,5-0,75 литра контрастного раствора, для приготовления которого необходимо развести ½ ампулы 76% натрия амидотризоата в 0,5-0,75 литра воды.

— за 2 часа до исследования – очистительная клизма с помощью кружки Эсмарха.

— исследование проводится с наполненным мочевым пузырем, после микроклизмы (состав: ½ ампулы 76% натрия амидотризоата + 200 мл воды)

— женщинам рекомендуется установка тампона во влагалище, пропитанного контрастным веществом.